



BMJ Best Practice

Canllaw dechrau arni



Sut i gael mynediad

- 1 Ewch i bestpractice.bmj.com
- 2 Gallwch gael mynediad ar unwaith o rwydwaith GIG Cymru, neu rhowch eich enw defnyddiwr a chyfrinair OpenAthens a chliciwch 'Log in'*
- 3 Os ydych chi'n ddefnyddiwr newydd, bydd bellach angen i chi gofrestru i gael cyfrif personol BMJ Best Practice. Defnyddiwch eich cyfrif personol i lawrlwytho'r ap er mwyn cael mynediad o unrhyw le, unrhyw bryd, hyd yn oed all-lein.

*Os bydd angen help arnoch gyda'ch cyfrif OpenAthens GIG Cymru neu i greu eich cyfrif BMJ Best Practice, ewch i eli.gig.cymru/mewngofnodi neu cysylltwch â'ch llyfrgell leol.



Lawrlwythwch ap BMJ Best Practice

- Chwiliwch am 'BMJ Best Practice', cliciwch 'download' a rhowch fanylion eich cyfrif personol i fewngofnodi.
- Mae'r ap yn gweithio all-lein, felly gallwch gael gafael ar gynnwys clinigol ble bynnag a phryd bynnag yr hoffech chi!





Angen help? Os bydd gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â'n tîm cymorth yn: support@bmj.com | +44 (0) 20 7111 1105





Sganiwch i ddechrau arni


Eich canllaw arbenigol ar ddiagnosis, prognosis, triniaeth ac atal, o unrhyw le, unrhyw bryd

 Miloedd o bynciau clinigol a mwy na 6,000 o ganllawiau clinigol y gellir chwilio drwyddynt


 Fideos wedi'u hanimeiddio o driniaethau meddygol a llawfeddygol


 500+ o daflenni i gleifion sy'n rhoi crynodebau byr a hawdd eu deall

 Diweddariadau Pwysig ac Atebion Clinigol Cochrane wedi'u hamlygu o fewn pob pwnc

 Datblygiad proffesiynol parhaus, gyda thracio awtomatig ar gyfer Addysg Feddygol Barhaus/Datblygiad Proffesiynol Parhaus

 Canllawiau ar bresgripsiynau yn seiliedig ar BNF, BNFC a mwy na 250 o gyfrifiannellau meddygol

 Canllawiau cam wrth gam drwy ein tablau algorithm triniaeth unigryw

 Mynediad o unrhyw le, ar-lein ac all-lein, gan ddefnyddio ap BMJ Best Practice




Rheolwr Cydafiacheddau ar gael o fewn BMJ Best Practice

➤ Mae'r Rheolwr Cydafiacheddau yn helpu i reoli'r claf cyfan drwy roi canllawiau ar sut i drin cyflyrau aciwt ochr yn ochr â chydafiacheddau a oedd gan y claf eisoes.

➤ Gallwch ddewis o blith amrywiaeth o gydafiacheddau cyffredin ac uchel eu cost er mwyn llunio cynllun triniaeth ar unwaith, wedi'i deilwra yn unol ag anghenion unigryw'r claf.

➤ Mae'r Rheolwr Cydafiacheddau yn ei gwneud hi'n hawdd trin a sefydlogi cleifion sydd â chydafiacheddau yn gyflym. Mae'r dull hwn o reoli'r claf yn effeithiol yn gwella effeithlonrwydd ac ansawdd gofal, gan arwain yn y pen draw at well canlyniadau clinigol, cyfnodau byrrach yn yr ysbyty, a llai o achosion o aildderbyn cleifion i'r ysbyty.



BMJ Best Practice

Search conditions, symptoms...

Recent updates Specialties Calculators Comorbidities Patient leaflets Videos Case reports Evidence Drugs

English Portuguese Russian

Bacterial meningitis in adults

OVERVIEW	THEORY	DIAGNOSIS	MANAGEMENT	FOLLOW UP	RESOURCES
Summary	Epidemiology Aetiology Case history	Recommendations History and exam Investigations Differentials	Recommendations Treatment algorithm Emerging Prevention Patient discussions	Monitoring Complications Prognosis	Guidelines Images and videos References Patient leaflets Calculators Evidence

Treatment algorithm

Please note that formulations/routes and doses may differ between drug names and brands, drug formularies, or locations. Treatment recommendations are specific to patient groups: see disclaimer.

➔ Add your patient's comorbidities for tailored treatment recommendations

If your patient is pregnant or a child, do not select comorbidities using this tool. Use the standard algorithm and seek specialist advice on comorbidities.

<input checked="" type="checkbox"/> Diabetes	<input type="checkbox"/> Heart failure	<input type="checkbox"/> COPD	OTHER CONSIDERATIONS	
<input type="checkbox"/> Chronic Kidney Disease (CKD)	<input type="checkbox"/> Stroke	<input type="checkbox"/> Asthma		<input type="checkbox"/> Suspected frailty
<input type="checkbox"/> Coronary artery disease	<input type="checkbox"/> Dementia	<input type="checkbox"/> Depression		<input type="checkbox"/> Current smoker
<input type="checkbox"/> Hypertension				

The following comorbidities have been added: **DIABETES**

INITIAL

ACUTE / confirmed bacterial meningitis: Haemophilus influenzae

➔ suspected bacterial meningitis: presenting in hospital

- <50 years and immunocompetent
- ≥50 years or immunocompromised

➔ suspected bacterial meningitis: presenting in the community

1ST LINE

urgent hospital transfer

CONSIDER

antibiotic prior to hospital

PLUS

corticosteroid

Treatment recommended for ALL patients in selected patient group

Continue dexamethasone for 4 days if the organism is confirmed to be *H influenzae* [16][26] [30][30]

Patients usually receive the full course of dexamethasone treatment as an inpatient.

DIABETES

Manage your patient's diabetes when they are taking corticosteroids

Evidence: Corticosteroid therapy in bacterial meningitis – effectiveness

Evidence: Corticosteroid therapy – stopping or continuing treatment

Dilynwch y camau hyn i'w ddefnyddio

1 Ar ôl mewngofnodi i BMJ Best Practice, cliciwch ar yr eicon 'Comorbidities' yn y bar llywio glas ar dudalen hafan BMJ Best Practice i weld rhestr o'r holl bynciau aciwt sydd yn y Rheolwr Cydafiacheddau.

2 Dewiswch bwnc aciwt o'r rhestr. Byddwn yn ychwanegu rhagor o bynciau at y rhestr drwy'r amser, felly cadwch olwg arni'n rheolaidd.

3 Llywiwch i adran 'Treatment algorithm' y pwnc aciwt o'ch dewis. Mae'r symbol C+ pinc yn dangos bod y Rheolwr Cydafiacheddau ar gael ar gyfer y pwnc dan sylw.

4 Dewiswch o restr o gydafiacheddau cyffredin. Gallwch ddewis cynifer o gydafiacheddau ag yr hoffech chi. Byddwch yn gweld y symbol C+ pinc pan fydd modd i'r cydafiacheddau sydd wedi'u dewis effeithio ar yr opsiwn triniaeth.



Sganiwch i ddechrau arni